

**Kocsis Imre**

## **A FÜGGVÉNYEGYENLETEK EREDETÉRŐL ÉS TERMÉSZETÉRŐL**

*„Közelítsd meg a problémát a helyes irányból: kezd a válasszal.  
Egy napon talán rátalálsz a valódi kérdésre is.” (R. van Gulik)*

### **I. BEVEZETÉS**

A függvényegyenlet témakör egységes és rendszeres tárgyalása a XX. század második felében kezdődött, de az a szemlélet és megközelítési mód, mely az egyenletek felírásához vezet, régóta jelen van úgy a matematikában, mint a természet- és a társadalomtudományok számos más területén.

A természet, a társadalom folyamatait vagy absztrakt rendszereket vizsgálva a korábbi tapasztalatokra alapozott kísérletekkel és logikai megfontolásokkal hosszabb-rövidebb úton kiismerjük ezek törvényszerűségeit, a jellemző mennyiségek közötti kapcsolatokat, és eljutunk függvényekhez, melyek explicit módon leírják a vizsgált folyamatot. Egy formula – esetleg igen bonyolult – explicit formáját látva felvetődik a kérdés, hogy milyen alapvető természeti törvények vannak a kapott megoldás háttérében. Ha az ilyen típusú felvetésekre sikerül válaszolni, akkor eredményként általában a folyamat meghatározó paraméterei közötti „természetes” kapcsolatot kifejező implicit összefüggések (leggyakrabban egyenletek) adódnak. Ezt – az igen gyakran alkalmazott – megközelítési módot axiomatikus módszernek nevezzük. Függvényegyenletek elsősorban különféle problémák axiomatikus megközelítéséből származnak.

A függvényegyenletek szisztematikus vizsgálatának elindítása Aczél János nevéhez fűződik, aki 1952-től 1965-ig Debrecenben a Matematikai Intézet Analízis Tanszékének vezetőjeként alapította meg az e témakörrel foglalkozó kutatócsoportot. 1965-től a Kanadai Waterloo Egyetem professzoraként folytatta munkáját, melynek eredményeként a világ számos országában – elsősorban Európában és Észak-Amerikában – indultak kutatások ebben a témakörben. Debrecenben Daróczy Zoltán akadémikus vezetésével folytatódtak, és aktívan folynak most is a vizsgálatok ezen a területen.

Ma a függvényegyenletek vizsgálata nagyon sok szálon fut, a vizsgálati módszerek, bizonyítási technikák és az eredmények teljes körű áttekintése szinte lehetetlen. Az utóbbi évtizedekben számos tudományterület indult fejlődésnek, amelyek új szemléletmódot kívánnak, problémáik megfogalmazásában kilépnek

a „klasszikus” matematika megszokott világából. Az információelmélet, az informatika, a viselkedéstudomány, a pszichometria, a matematikai közgazdaságtan, a mesterséges intelligencia elmélete és sok egyéb tudomány a megoldandó függvényegyenletek bőséges tárházát szolgáltatják. A sokszínűség az egyenletek eredetét illetően az egyenletek sokféleségét eredményezi. A függvényegyenlet témakör iránt érdeklődő olvasó figyelmébe ajánljuk az irodalomjegyzékben felsorolt munkákat.

## 2. AXIÓMARENDSZEREK, JELLEMZÉSEK

Egy folyamat vagy rendszer „működését” általában akkor tekintjük leírni (ismertnek), ha sikerül megadni a folyamat vagy rendszer meghatározó paraméterei (állapotjelzői) közti explicit kapcsolatot (függvényt). A kísérleti vagy logikai úton nyert törvényszerűség – esetleg igen bonyolult – explicit formáját látva felvetődik a kérdés, hogy milyen alapvető törvényszerűségek vannak a kapott megoldás hátterében. Ez lényegében a paraméterek közötti „természetes” követelmények összegyűjtését jelenti, melyek általában implicit összefüggések (egyenletek) formájában állnak elő.

A vizsgált problémakör ismerői által természetesnek mondott összefüggések tulajdonsághalmazt (axiómarendszert) alkotnak. Kérdés, hogy milyen függvények tesznek eleget az axiómáknak.

Az esetek többségében van ismert megoldás: az a függvény, vagy azok a függvények, melyeket a szakértők a saját tapasztalataik alapján konstruáltak, és az adott probléma megoldásaként elfogadottak. Ilyenkor általában úgy vetődik fel a kérdés, hogy van-e más megoldás, mint a „megszokott” függvény? Ha nincs, akkor ez a korábbi eredményeket erősíti, ha van, akkor vagy az axiómákat kell felülvizsgálni, vagy el kell gondolkodni azon, hogy a korábban ismeretlen megoldásokkal mit lehet „kezdeni”. Az esetek egy részében a megoldásfüggvényre kiszabott regularitási feltételek mellett már csak a „jó” megoldást kapjuk, máskor viszont kiderül, hogy a várt megoldások mellett más függvényosztályok elemei is eleget tesznek az axiómáknak.

Könnyen előfordulhat, hogy éppen egy „nem várt” megoldás tereli új irányokba a problémakör vizsgálatát, nyit új utakat, és hoz új eredményeket. Hasonló ez a fizikai elméletek ellenőrzéséhez, amikor kísérleteket végzünk egy vélt tétel alátámasztására. Ha a kísérlet eredménye igazolja a felállított törvényszerűséget, akkor „hátradőlhetünk” és „csodálhatjuk” a természet megismerése irányába tett újabb sikeres lépésünket. Ha viszont eltérés mutatkozik a várt és a bekövetkezett eredmény között, akkor annak utána kell járnunk, meg kell értenünk mi az eltérés oka. Ezek azok a tapasztalások, melyek új utat nyitnak a kutatásnak és új, meglepő gondolatok elfogadásához vezetnek.

Az is megfogalmazható célként, hogy olyan feltételrendszert írjunk le, melynek a probléma lehetséges megoldásai közül csak bizonyosak feleljenek meg. Az ilyen feltételrendszerek előállítását az adott objektum (függvény) jellemzésnek nevezzük.

### 3. NÉHÁNY, FÜGGVÉNYEGYENLETRE VEZETŐ, KLASSZIKUS PROBLÉMA

Ebben a részben felvázolunk néhány problémát, és ezekhez kapcsolódóan felírjuk azokat a „természetes elvárásokat”, melyektől azt várjuk, axiómarendszerként meghatározzák a probléma megoldásfüggvényeit.

Meghatározva az axiómarendszernek eleget tevő megoldásokat, egyszer azt tapasztaljuk, hogy „triviális eredményre” jutunk, ilyenkor a felületes szemlélő még azt is érezheti, hogy „erőltetett” az axiomatikus felépítés (*előfordulhat ez például a téglalap területét megadó függvény jellemzésekor*), máskor pedig azt érezzük, hogy a természetes elvárásoknak eleget tevő függvény meglepő alakú (*ilyen érzésünk lehet például a Shannon entrópia esetén*). Igaz ez annak ellenére, hogy mindkét esetben egyformán elfogadjuk a kiinduló feltételek természetességét.

A konkrét problémák bemutatása előtt néhány szót szólnunk az additivitás egyenletéről:

$$(C) \quad f(x+y) = f(x) + f(y)$$

az ún. **Cauchy egyenletről**, mely újra és újra megjelenik a függvényegyenletek vizsgálata során. A Cauchy egyenlet alapvető szerepe abból adódik, hogy az additivitási tulajdonság gyakran természetes követelmény a problémákhoz kapcsolódó függvények esetén.

Azt, hogy a (C) egyenlet folytonos megoldásai (vagyis a folytonos additív függvények) a lineáris függvények már Cauchy megmutatta 1821-ben. Az indoklás könnyen áttekinthető, és érdemes végiggondolni annak, aki némi tapasztalatot akar szerezni a függvényegyenletekkel kapcsolatos számolásokról.

A következő gondolatmenet érvényes attól függetlenül, hogy a (C) egyenletben szereplő  $f$  függvény értelmezési tartománya a valós számok halmaza, a nemnegatív valós számok halmaza, vagy a pozitív valós számok halmaza.

Most tegyük fel, hogy  $f$  a pozitív valós számok halmazán értelmezett valós értékű függvény ( $f: ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbf{R}$ ) és hogy (C) fennáll minden  $0 < x \in \mathbf{R}$  és  $0 < y \in \mathbf{R}$  esetén.

A (C) egyenletből indukcióval azonnal látható, hogy  $f(n \cdot x) = n \cdot f(x)$   $n \in \mathbf{N}$ ,  $0 < x \in \mathbf{R}$  ( $\mathbf{N}$  a pozitív egész számok halmaza), vagyis hogy az  $f$  függvényből kiemelhetők a pozitív egész szorzók.

Továbbá, ha  $n$  és  $m$  pozitív egészek,  $0 < x \in \mathbf{R}$ ,  $0 < t \in \mathbf{R}$  és  $n \cdot x = m \cdot t$ , akkor  $f(n \cdot x) = f(m \cdot t)$  és a pozitív egész szorzók kiemelhetősége miatt  $n \cdot f(x) = m \cdot f(t)$ , így

$$f\left(\frac{m}{n} \cdot t\right) = f(x) = \frac{m}{n} \cdot f(t)$$

vagyis az  $f$  függvényből a racionális szorzók is kiemelhetők.

A  $t=1$  helyettesítéssel, a  $c=f(1)$  jelölést alkalmazva minden pozitív racionális  $r$  esetén  $f(r) = r \cdot f(1) = c \cdot r$ .

Végül, ha az  $f$  függvényről megköveteljük a folytonosságot, akkor ebből következik, hogy  $f(x) = c \cdot x$ ,  $0 < x \in \mathbf{R}$ .

## 2.1. A négyzet függvények jellemzése

Akár az ókorig is vissza lehet menni, ha függvényegyenletre vezető problémák után kutatunk, hiszen például a rekurzív sorozatokkal már Archimedesz és kortársai is foglalkoztak. Az első, a mai szemmel is jelentős problémafelvetés Oresme-től származik, aki 1352-ben alkotta meg szövegesen az egyenletesen változó mennyiség fogalmát. Ez – a mai jelöléseket alkalmazva – a következő formában írható:

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{f(x_2) - f(x_3)} = \frac{x_1 - x_2}{x_2 - x_3}$$

Oresme foglalkozott a négyzet függvények ( $x \rightarrow a \cdot x^2$ ) jellemzésével és a korabeli nyelven megfogalmazta a következő egyenlőséget, mely a mai jelölésekkel következő formában írható:

$$\frac{f((n+1) \cdot t) - f(n \cdot t)}{f(n \cdot t) - f((n-1) \cdot t)} = \frac{2n+1}{n}, \quad 0 < t \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N}.$$

Gallilei a XVIII. században újra felvetette a problémát a szabadesés törvényszerűségét keresve. Bár nem igazolták, tényként kezelték, hogy az egyenlet megoldásai az  $x \rightarrow a \cdot x^2$  ( $a \in \mathbf{R}$ ) alakú négyzet függvények.

## 2.2. Erők eredője (összege)

Azt, hogy egy probléma megoldása egy egyenlet megoldásaként adódik természetesnek fogadjuk el, ha például differenciálegyenletről van szó. Az alábbi példa – az erők eredőjének meghatározására szolgáló paralelogramma szabály axiomatikus megalapozása – alapján világos, hogy függvényegyenlet is alkalmas lehet megoldásfüggvény meghatározására.

A paralelogramma szabály axiomatikus megalapozását d'Alembert kezdeményezte a XVIII. század közepén. Lényegében az alábbi axiómákat fogalmazta meg:

1. AXIÓMA

**A vektorok Abel csoportot alkotnak az összeadásra nézve**, vagyis az összeadás kommutatív és asszociatív, létezik additív egység (a zérusvektor) és minden elemnek van additív inverze.

2. AXIÓMA

**Az összeadás rotáció-automorf**, azaz – egyszerűen fogalma – az összeg együtt forog a vektorokkal. *(Ennek a tulajdonságnak közvetlen következménye, hogy az eredő hossza csak a vektorok hosszától és a közbezárt szögétől függ).*

3. AXIÓMA

**Az eredő hossza a vektorok hosszának és szögének folytonos függvénye.**

4. AXIÓMA

**A párhuzamos vektorok hossza algebrailag összegződik.**


Megmutatjuk, hogy – egyenlő hosszúságú vektorok esetén – az axiómákból miként következik, hogy az összegzés megfelelő módja a paralelogramma szabály.

A 2. axiómából következik, hogy – egyenlő hosszúságú vektorok esetén – az eredő iránya a vektorok által bezárt szög felezőjének iránya, így csak a hossza vonatkozó formulát kell levezetni.


Először az eredő hosszának a vektorok hosszától való függését vizsgáljuk.

Ha a vektorok hossza  $x$  ( $0 < x \in \mathbf{R}$ ), akkor az eredő hosszát jelölje  $f(x)$  ( $f: ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbf{R}$ ).

Legyen  $0 < x \in \mathbf{R}$ ,  $0 < y \in \mathbf{R}$ , és legyen  $\underline{p}_1$  a  $\underline{p}_2$ -vel, ill.  $\underline{q}_1$  a  $\underline{q}_2$ -vel párhuzamos vektor úgy, hogy  $|\underline{p}_1| = |\underline{q}_1| = x$ ,  $|\underline{p}_2| = |\underline{q}_2| = y$ , és (a 4. axióma következtében)  $|\underline{p}_1 + \underline{p}_2| = |\underline{q}_1 + \underline{q}_2| = x + y$ . (1. ábra)



1. ábra



2. ábra

Az eredők:  $\underline{r}_1 = \underline{p}_1 + \underline{q}_1$ ,  $\underline{r}_2 = \underline{p}_2 + \underline{q}_2$ ,  $\underline{r} = \underline{r}_1 + \underline{r}_2 = (\underline{p}_1 + \underline{q}_1) + (\underline{p}_2 + \underline{q}_2)$ , így  $|\underline{r}_1| = f(x)$ ,  $|\underline{r}_2| = f(y)$ ,  $|\underline{r}| = f(x+y)$ .

Ekkor egyrészt a 4. axióma miatt

$$|(\underline{p}_1 + \underline{q}_1) + (\underline{p}_2 + \underline{q}_2)| = |\underline{r}_1 + \underline{r}_2| = |\underline{r}_1| + |\underline{r}_2| = f(x) + f(y),$$

másrészt az 1. axióma miatt

$|(p_1+q_1) + (p_2+q_2)| = |(p_1+p_2) + (q_1+q_2)| = |r| = f(x+y)$ ,  
 vagyis (C) fennáll minden  $0 < x \in \mathbf{R}$  és  $0 < y \in \mathbf{R}$  esetén.

A 3. axióma szerint  $f$  folytonos, így  $f(x) = c \cdot x$  valamely  $c \in \mathbf{R}$  mellett, vagyis az eredő hossza arányos a vektorok (közös) hosszával.

Vizsgáljuk mostmár az eredő hosszának a vektorok szögétől való függését (továbbra is egyenlő hosszúságú vektorok esetén).

Két, egységnyi hosszúságú,  $2\varphi$  szöget bezáró vektor eredőjének hosszát jelölje  $2g(\varphi)$ . Mivel a fentiek szerint az eredő hossza arányos a vektorok hosszával, két  $x$  hosszúságú,  $2\varphi$  szögű vektor eredőjének hossza  $x \cdot 2g(\varphi)$ .

Tekintsük a  $p, p_1, p_2, q, q_1, q_2$  vektorokat, melyek a következő tulajdonságokkal bírnak:

$|p_1| = |p_2| = |q_1| = |q_2| = 1$ ,  $p = p_1 + p_2$ ,  $q = q_1 + q_2$ ,  $r_1 = p_1 + q_1$ ,  $r_2 = p_2 + q_2$ ,  
 $r = p + q$ , a  $p_1$  és a  $p_2$  ill. a  $q_1$  és a  $q_2$  vektorok szöge  $2\psi$ , így  
 $|p| = |p_1+p_2| = |q| = |q_1+q_2| = 2g(\psi)$ , a  $p$  és a  $q$  vektorok szöge  $2\varphi$ . (2. ábra)

Figyelembe véve, hogy az eredő hossza arányos a vektorok hosszával

$$|r| = |p+q| = |(p_1+p_2) + (q_1+q_2)| = 2g(\psi) \cdot 2g(\varphi).$$

Mivel a  $p_1$  és a  $q_1$  vektorok szöge  $2(\psi+\varphi)$ , a  $p_2$  és a  $q_2$  vektorok szöge  $2(\psi-\varphi)$ ,

$$|r_1| = |p_1+q_1| = 2g(\psi+\varphi), \quad |r_2| = |p_2+q_2| = 2g(\psi-\varphi),$$

továbbá a 2. axióma az  $r_1$ , és az  $r_2$  vektorok iránya a  $p$  és a  $q$  vektorok által bezárt szög felezője.

Így az 1. és a 4. axiómák szerint

$$|r| = |(p_1+p_2)+(q_1+q_2)| = |(p_1+q_1)+(p_2+q_2)| = |r_1|+|r_2| = 2g(\psi+\varphi)+2g(\psi-\varphi).$$

Ezt összevetve az  $|r| = 4g(\psi) \cdot g(\varphi)$  egyenlőséggel, a  $g$  függvényre a

$$g(\psi+\varphi) + g(\psi-\varphi) = 2g(\psi) \cdot g(\varphi)$$

egyenlet, az ún. d'Alembert-féle függvényegyenlet adódik. A d'Alembert egyenlet folytonos megoldásai, ahogyan azt 1831-ben maga d'Alembert kimutatta:

$$g(\varphi) = 0, \text{ vagy } g(\varphi) = \text{ch}(k\varphi), \text{ vagy } g(\varphi) = \cos(k\varphi),$$

ahol  $k$  tetszőleges valós szám.

Könnyen igazolható, hogy az axiómáknak csak a

$$g(\varphi) = \cos(\varphi)$$

függvény felel meg.

Tehát két,  $x$  hosszúságú,  $2\varphi$  szögű vektor eredőjének hossza  $2 \cdot x \cdot \cos(\varphi)$ , ami azonos a paralelogramma szabállyal számított értékkel.

### 2.3. Legendre-féle probléma: a téglalap területét megadó függvény jellemzése

A téglalap területét az oldalhosszakból megadó  $T: \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$  függvényről (ahol  $\mathbf{R}^+$  a nemnegatív valós számok halmazát jelöli) – a szemlélet alapján – feltehető, hogy teljesíti az alábbi négy tulajdonságot (axiómát):

1. AXIÓMA

$T(x, y) \geq 0$ , ha  $x \geq 0, y \geq 0$  (nemnegativitás)

2. AXIÓMA

$T(x_1 + x_2, y) = T(x_1, y) + T(x_2, y)$ , ha  $x_1, x_2, y \in \mathbf{R}^+$  (additivitás az első változóban)

3. AXIÓMA

$T(x, y_1 + y_2) = T(x, y_1) + T(x, y_2)$ , ha  $x, y_1, y_2 \in \mathbf{R}^+$  (additivitás a második változóban)

4. AXIÓMA

$T(1, 1) = 1$  (az egységnégyzet területe 1)

*Kérdés:* melyek azok a  $T: \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$  függvények, melyek teljesítik az 1-4 tulajdonságokat (Legendre 1791)?

*Válasz:* A választ 1880-ban Darboux adta meg, miszerint csak a jól ismert a  $T(x, y) = x \cdot y$  függvény tesz eleget a fenti axiómáknak.

### 2.4. A konzisztens aggregáció problémája

A **közgazdaságtanban** a következőképpen értelmezik a konzisztens aggregáció problémáját:

Tegyük fel, hogy egy rendszerben  $m$  db **termelő** mindegyike  $n$  fajta **ráfordítással** termel. Jelölje  $x_{ij}$  a  $j$ -edik ráfordítás mértékét az  $i$ -edik termelő esetén ( $i=1, \dots, m, j=1, \dots, n$ ).

Az  $i$ -edik termelő maximális kibocsátását az  $n$  változós (termelőspecifikus)

$$(x_{i1}, \dots, x_{in}) \rightarrow F_i(x_{i1}, \dots, x_{in}), \quad (i=1, \dots, m),$$

**mikroökonómiai termelési függvény** írja le.

A  $j$ -edik típusú ráfordításokból adódó aggregált ráfordítás mértékét az  $m$  változós

$$(x_{1j}, \dots, x_{mj}) \rightarrow G_j(x_{1j}, \dots, x_{mj}), \quad (j=1, \dots, n)$$

**aggregáló függvényekkel** számolhatjuk.

A termelőnként kiszámított  $F_1(x_{11}, \dots, x_{1n}), \dots, F_m(x_{m1}, \dots, x_{mn})$  kibocsátásokból egy újabb  $m$  változós **G aggregáló függvénnyel** összesíthetjük a teljes kibocsátást, de ezt megtehetjük a ráfordításoként kapott  $G_1(x_{11}, \dots, x_{m1}), \dots, G_n(x_{1n}, \dots, x_{mn})$  aggregált ráfordításokból is egy újabb  $n$  változós **F függvénnyel**, a **makroökonómiai termelési függvénnyel** is.

		ráfordítások			kibocsátás
		1	...	n	
termelők	1	$x_{11}$	...	$x_{1n}$	$F_1(x_{11}, \dots, x_{1n})$
	:	:		:	:
	m	$x_{m1}$	...	$x_{mn}$	$F_m(x_{m1}, \dots, x_{mn})$
kibocsátás		$G_1(x_{11}, \dots, x_{m1})$	...	$G_n(x_{1n}, \dots, x_{mn})$	?

3. ábra

*Kérdés:* milyen  $F_1, \dots, F_m, G_1, \dots, G_n, F$  és  $G$  függvények mellett adja a kétféle számítás ugyanazt az eredményt (mikor lesz konzisztens az aggregáció), azaz mikor áll fenn a változók lehetséges értékei mellett a

$$G(F_1(x_{11}, \dots, x_{1n}), \dots, F_m(x_{m1}, \dots, x_{mn})) = F(G_1(x_{11}, \dots, x_{m1}), \dots, G_n(x_{1n}, \dots, x_{mn}))$$

ún. **általánosított biszimmetria egyenlet?**

*Válasz:* A probléma jelenleg is vizsgált, csak bizonyos regularitási feltételek mellett ismert a megoldása.

Ha például a ráfordításokat pénzben fejezzük ki, és az aggregálásra az egyszerű összeadást használjuk – a gyakorlatban általában ezzel az egyszerű módszerrel élnek –, akkor az általánosított biszimmetria egyenlet a sokkal egyszerűbb

$$F((x_{11}, \dots, x_{m1}) + \dots + (x_{1n}, \dots, x_{mn})) = F_1((x_{11}, \dots, x_{1n}) + \dots + F_m(x_{m1}, \dots, x_{mn}))$$

ún. **Pexider egyenletbe** megy át, amelyről ismert, hogy a folytonos megoldásai a legfeljebb elsőfokú polinomok.

Ezzel szemben az elméleti közgazdaságtanban leggyakrabban használt termelési függvények mások:

a **CD (Cobb-Douglas) függvények:**

$$F(x_1, \dots, x_n) = a \cdot x_1^{b_1} \cdot \dots \cdot x_n^{b_n} \quad (x_1, \dots, x_n \in ]0, +\infty[)$$

ahol  $0 < a \in \mathbf{R}, 0 \neq b_1 \in \mathbf{R}, \dots, b_n \in \mathbf{R}$

a **CES (Constant Elasticity of Substitution) függvények:**

$$F(x_1, \dots, x_n) = a \cdot (c_1 \cdot x_1^b + \dots + c_n \cdot x_n^b)^{\frac{1}{b}} \quad (x_1, \dots, x_n \in ]0, +\infty[)$$

ahol  $0 \neq b \in \mathbf{R}, 0 < c_1 \in \mathbf{R}, \dots, 0 < c_n \in \mathbf{R}$ , ami arra utal, hogy az aggregálásra az egyszerű összeadástól különböző függvényeket kell használni. A biszimmetria egyenlet megoldása ezek megtalálásához is elvezet.

## 2.5. Az információ méréseéről

Az információ mérésének kérdését – a gyakorlatban alkalmazott kódolási, kódfejtési tapasztalataira építve – C. E. Shannon, mérnök vetette fel a XX. század közepén. Megfigyelte, hogy a jelrendszerekben az egyes szimbólumok előfordulási valószínűsége (és ennek következtében az információtartalma) általában nem azonos: az információtartalmat annál nagyobbának találta, minél kisebb az előfordulás valószínűsége. Egy jelrendszer átlagos



információtartalmára (entrópiájára), ahol az egyes szimbólumok előfordulási valószínűsége  $p_i$  ( $i=1, \dots, n$ ) Shannon a

$$H_n(p_1, \dots, p_n) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$$

formulát javasolta. Miután ez hasonló a Maxwell-Boltzmann gázelméletben az ideális gáz entrópiáját leíró egyenlethez, Shannon ennek a mennyiségnek is az entrópia nevet adta. Az entrópia a rendszerben lévő határozatlanság (rendezetlenség) mértékének tekinthető. Az entrópiának a fizikából ismert fontos tulajdonságai: az entrópia nem negatív; az entrópia invariáns az állapotok sorrendjének felcserélésére nézve; zárt rendszerben az entrópia nem csökkenhet, vagyis az entrópiát csak külső hatással (pl. energia befektetéssel) lehet csökkenteni; ha a rendezettség növekszik, akkor az entrópia és a stabilitás csökken; a stabil rendszerek teljesen rendezetlenek.

Hogy eljussunk az információ mértékének absztrakt fogalmához, tekintsünk egy  $(\Omega, A, P)$  Kolmogorov-féle (nem atomos) valószínűségi mezőt. Fogadjuk el, hogy információ-mennyiséget nem nulla valószínűségű véletlen eseményhez rendelhetünk, és azt, hogy az információ-mennyiség kizárólag az esemény valószínűségétől függ, azaz van olyan  $I: ]0,1] \rightarrow \mathbf{R}$  függvény, melyre egy  $0 \neq p$  valószínűségű  $A$  esemény bekövetkezésekor nyert információ mennyisége  $I(p)$ . Az  $I$  függvénnyel szemben az alábbi természetes követelményeket (axiómákat) támaszthatjuk:

1. AXIÓMA

$$I(p) \geq 0, \quad \text{ha } p \in ]0,1]$$

(az információ mennyisége nem lehet negatív)

2. AXIÓMA

$$I(p \cdot q) = I(p) + I(q), \quad \text{ha } p \in ]0,1], q \in ]0,1]$$

(független események együttes bekövetkezésekor nyert információ-mennyiség egyenlő a külön-külön nyert információ-mennyiségek összegével)

3. AXIÓMA

$$I(1/2) = 1$$

( $1/2$  valószínűségű esemény bekövetkezésekor nyert információ-mennyiség egységnyi: 1 bit. Az elnevezés összefügg azzal, hogy egy kétállapotú tároló 1 bit tárolására alkalmas.)

Itt meg kell jegyezni, hogy a 2. axiómában szereplő egyenletből a  $p=2^{-u}$ ,  $u \in [0, +\infty[$ ,  $q=2^{-v}$ ,  $v \in [0, +\infty[$  helyettesítésekkel a  $g(t)=I(2^{-t})$ ,  $t \in [0, +\infty[$  függvényre szintén  $g(u+v) = g(u) + g(v)$ ,  $u \in [0, +\infty[$ ,  $v \in [0, +\infty[$  Cauchy egyenlet adódik.

Jól ismert eredmény, hogy az 1-3 axiómákat csak a  $H(p) = -\log_2 p$ ,  $p \in ]0,1]$  függvény teljesíti (lásd [1]).

A  $H(p) = -\log_2 p$  függvény ismeretében könnyen látható, hogy a Shannon által bevezetett formula eseményekhez rendelt információ-mennyiségek súlyozott átlagát adja: ha egy rendszer  $n$  különböző állapotban lehet, és ezek

valószínűsége  $p_1, \dots, p_n$ , akkor a rendszerhez rendelt entrópia az egyes állapotokhoz, mint véletlen eseményekhez tartozó  $-\log_2 p_i$  információ-mennyiségeknek a  $p_i$  valószínűségekkel képzett súlyozott átlaga:

$$H_n(p_1, \dots, p_n) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$$

#### 4. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] Aczél, J., *Lectures on Functional Equations and Their Applications*, Academic Press, New York, London, 1966.
- [2] Aczél, J., *On Applications and Theory of Functional Equations*, Birkhäuser, Basel, 1969. Elemente der Mathematik vom höheren Standpunkt, Band V.
- [3] Aczél, J., (editor) *Functional Equations: History, Applications and Theory*, Reidel, Dordrecht, 1984.
- [4] Aczél, J., *On history, applications and theory of functional equations*, In *Functional equations: history, applications and theory*, pages 3–12. Reidel, Dordrecht, 1984.
- [5] Aczél, J., *A Short Course on Functional Equations* (Based Upon Recent Applications to the Social and Behavioral Sciences). Reidel, Dordrecht, 1987.
- [6] Aczél, J., Daróczy, Z., *On Measures of Information and Their Characterization*, Academic Press, New York – San Francisco-London, 1975.
- [7] Aczél, J. and Dhombres, J., *Functional Equations in Several Variables*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989. With applications to mathematics, information theory and to the natural and social sciences.
- [8] Aczél, J. and Golab, S., *Funktionalgleichungen der Theorie der geometrischen Objekte*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw, 1960. Polska Akademia Nauk. Monografie Matematyczne, Tom 39.
- [9] Daróczy, Z., Losonczi, L., *Über die Erweiterung der auf einer Punktmenge additiven Funktionen*, Publ. Math. Debrecen **14**(1967), 239-245.
- [10] Ebanks, B.R., Sahoo, P.K., Sander, W., *Characterizations of information measures*, World Scientific, Singapore – New Jersey – London – Hong Kong, 1998.
- [11] Kuczma, M., *An Introduction to the Theory of Functional Equations and Inequalities*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Uniwersytet Śląski, Warszawa–Kraków–Katowice, 1985.

- [12] Kuczma, M., Choczewski, B., and Ger, R., *Iterative Functional Equations*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
- [13] Luce, R.D., *Utility of Gains and Losses: Measurement-Theoretical and Experimental Approaches*, Lawrence Erlbaum Publishers, London–Mahwah–New Jersey, 2000.

## ON THE ORIGIN AND NATURE OF FUNCTIONAL EQUATIONS

In this paper we give a short introduction into the history functional equations. We present the so-called axiomatic method, which is widely used in various investigations in different fields of scientific research. Finally we show some examples for system of axioms leading to functional equations.