

## TERÜLETÁTALAKÍTÁSI FELADATOK RAJZOKBAN (I. rész)

**Tuzson Zoltán**

A következő feladatokat egyéni munkára szántuk mind általános iskolás, mind líceumi tanulóknak. Az összegyűjtött feladatok nagy előnye az, hogy elkészített rajzok szemléltetik a feladatokat, és a rajzok mellett röviden feltüntetjük a feltevést és a következtetést. Ezáltal a tanulók rövidebb idő alatt elemezhetik a feladatokat, könnyebben megérthetik, gyorsabban megoldhatják és rövid idő alatt sok új ötletre tehetnek szert.

Amint a cím is jelzi, nem számértékes területszámolási feladatokról van szó (noha ilyenekre is átfogalmazhatók), hanem különféle síkbeli alakzatokra bontás és egyesítés által – kiváltképpen az analízis-szintézis, összehasonlítás, kiegészítés, összefüggések észlelése, rendezés, analógia, lényegkiemelés stb. gondolkodási műveleteket használva – kell bizonyítanunk adott összefüggéseket, a különböző alakzatok területei között.

Az ilyen típusú feladatok egyszerűnek tűnhetnek, már kezdetben vonzóak lehetnek, és a kreativitást igénylő és fejlesztő szerepük vitathatatlan.


Mindenek előtt ismerkedjünk meg röviden a terület fogalmával. Jelöljük  $S$ -sel a síkbeli sokszöglapok halmazát. Azt a négyzetlapot, amelynek élhossza 1 egység, terület-egységnek nevezük, és  $E$ -vel jelöljük.

A terület egy olyan  $T: S \rightarrow \mathbb{R}_+$  függvény, amelyet a következő axiómákkal értelmezünk:

- (1) Ha  $E \in S$  a területegység, akkor  $T(E) = 1$ .
- (2) Ha  $S_1, S_2 \in S$ , és  $S_1 \equiv S_2$ , akkor  $T(S_1) = T(S_2)$ .
- (3) Ha  $S_1, S_2 \in S$ , és  $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ , akkor  $T(S_1 \cup S_2) = T(S_1) + T(S_2)$ .


A következő feladatok megoldása során, mivel minden sokszöglapot háromszöglapokra lehet felbontani, ezért leggyakrabban csak a derékszögű és az általános háromszöglapok területszámolási képleteit használjuk. Ezek mellett gyakran használjuk a nevezetes négyszöglapok területszámolási képleteit, továbbá szinte ösztönszerűen használjuk a (2)-es és (3)-as axiómákat, és mindezek mellett a már említett gondolkodási műveleteket. A feladatok után útmutatásokat is találunk.

(1)




Ha  $AB \parallel CD$ , akkor  $T_1 = T_2$ .

(2)




Ha  $T_1 = T_2$ , akkor  $AB \parallel CD$ .

(3)




Ha  $AB \parallel CD$  és  $BC \parallel AD$ ,  
akkor  $T_1 = T_2 = T_3 = T_4$ .

(4)




Ha  $T_1 = T_2 = T_3 = T_4$ , akkor  
 $AB \parallel CD$  és  $BC \parallel AD$ .

(5)




Ha  $AB \parallel CD$ ,  $BC \parallel AD$ ,  $M \in BD$ ,  
 $SQ \parallel AB$ ,  $PR \parallel BC$ , akkor  $T_2 = T_5$ .

(6)




Ha  $AB \parallel CD$ ,  $BC \parallel AD$  és  
 $M$  egy belső pont, akkor  
 $T_1 + T_3 = T_2 + T_4$ .

(7)




Ha  $AB \parallel CD$ ,  $BC \parallel AD$ ,  $AB = 3MB$ ,  
 $BC = 3BN$ , akkor  $T_1 = T_2 = T_3$ .

(8)




Ha  $AB \parallel CD$ ,  $BC \parallel AD$ ,  
 $M \in (AC)$ , akkor  
 $T_1 + T_2 = \frac{1}{2}T(ABCD)$ .

(9)




Ha  $AB \parallel CD$ ,  $BF = FC$ , akkor  
 $T = \frac{1}{2}T(ABCD)$ .

(10)




Ha  $AB \parallel CD$ ,  $AM = MB$ ,  $CN = ND$ ,  
 $Q \in (MN)$ , akkor  $T_1 = T_2$ .

(11)




Ha  $AM = MB$ ,  $BN = NC$ ,  
 $CP = PD$ ,  $DQ = QA$ ,  
 akkor  $T = \frac{1}{2}T(ABCD)$ .

(12)




Ha  $AM = MB$ ,  $BN = NC$ ,  
 $CP = PD$ ,  $DQ = QA$ , akkor  
 $T_1 + T_3 = T_2 + T_4 = \frac{1}{2}T(ABCD)$ .

(13)




Ha  $AN = NB$ ,  $CM = MD$ ,  
 akkor  $T_1 + T_2 = T_3$ .

(14)




Ha  $AM_1 = M_1M_2 = M_2B$ ,  
 $CN_2 = N_2N_1 = N_1D$ , akkor  
 $T_2 = \frac{1}{2}(T_1 + T_3)$ .

(15)




Ha  $AC \cap BD = \{O\}$ , akkor  
 $T_1 T_3 = T_2 T_4$ .

(16)




Ha  $AB \parallel CD$ , akkor  
 $\sqrt{T_1} + \sqrt{T_2} = \sqrt{T(ABCD)}$ .

(17)




Ha  $O$  belső pont,  $SP \parallel BC$ ,  
 $MQ \parallel AB$ ,  $NR \parallel AC$ , akkor  
 $\sqrt{T_1} + \sqrt{T_2} + \sqrt{T_3} = \sqrt{T(ABC)}$ .

(18)




Ha  $AB \parallel A'B'$ ,  $BC \parallel B'C'$ ,  $CA \parallel C'A'$ ,  
 és  $T = T(ABC)$ ,  $T' = T(A'B'C')$ , akkor  
 $\sqrt{T_1} + \sqrt{T_2} + \sqrt{T_3} + \sqrt{T_4} + \sqrt{T_5} + \sqrt{T_6} =$   
 $= \sqrt{T} + \sqrt{T'}$ .

(19)




$$T(ABC) = \frac{bc \cdot \sin A}{2}$$

(20)



Ha  $\frac{AM}{AB} = p$ ,  $\frac{AN}{AC} = q$ , ( $p, q > 0$ ),  
 akkor  $T = pqT(ABC)$ .


(21)



$$\text{Ha } BM = MN = \frac{1}{4}BC, \frac{CP}{CA} = \frac{2}{5},$$

$$\frac{AQ}{AB} = \frac{1}{3}, \text{ akkor } T = \frac{13}{30}T(ABC).$$

(22)




$$\text{Ha } \frac{BM}{BC} = \frac{CN}{BC} = \frac{1}{4},$$

$$\frac{CP}{CA} = \frac{PQ}{CA} = \frac{2}{5}, \frac{BR}{BA} = \frac{1}{3},$$

$$\text{akkor } T = \frac{41}{60}T(ABC).$$


(23)



$$\text{Ha } \frac{MN}{BC} = \frac{NC}{BC} = \frac{1}{4}, CP = AQ = \frac{2}{5}AC,$$

$$AR = SB = \frac{1}{3}AB, \text{ akkor } T = \frac{3}{5}T(ABC).$$


(24)



$$\text{Ha } B'B = BC, C'C = AC,$$

$$A'A = AB, \text{ akkor } T(A'B'C') = 7T.$$

(25)




$$\text{Ha } BA_1 = p \cdot A_1C, CB_1 = q \cdot B_1A,$$

$$AC_1 = r \cdot C_1B, p, q, r > 0, \text{ akkor}$$

$$T_1 = \frac{1 + pqr}{(1 + p)(1 + q)(1 + r)}T(ABC).$$

(26)




$$\text{Ha } B'B = p \cdot B'C, C'C = q \cdot C'A,$$

$$A'A = r \cdot A'B, 0 < p, q, r < 1, \text{ akkor}$$


$$T(A'B'C') = \frac{1 - pqr}{(1 - p)(1 - q)(1 - r)}T.$$

(27)




Ha  $MN \parallel BC$ ,  $\{O\} = BN \cap CM$ ,  
akkor  $T_1 = T_2$ .

(28)




Ha  $M$  tetszőleges belső pont  
és  $T_1 = T_2$ , akkor  $M$  az  
 $A$ -ból húzott oldalfelezőn van.

(29)



Ha  $M$  tetszőleges belső pont  
és  $T_1 = T_2 = T_3$ , akkor  
 $M$  a háromszög súlypontja.

(30)



Ha  $M$  tetszőleges belső pont  
és  $T_1 = T_2 = T_3 = T_4$ , akkor  
 $ABCD$  paralelogramma.

### Útmutatások a feladatok megoldásához

(1)  $T(ABD) = T(ABC) \Rightarrow T_1 + T(OAB) = T_2 + T(OAB) \Rightarrow T_1 = T_2$ .

(2)  $T_1 = T_2 \Rightarrow T_1 + T(OAB) = T_2 + T(OAB) \Rightarrow T(ABD) = T(ABC) \Rightarrow AB \parallel CD$ .

(3) Az (1)-et alkalmazzuk kétszer.

(4) A (2)-t alkalmazzuk kétszer.

(5)  $T(ABD) = T(CBD)$  és  $T_1 = T_6$ ,  $T_3 = T_4 \Rightarrow T_2 = T_5$ . ( $PBQM$  paralelogramma)

(6) Legyenek rendre  $m_1, m_2, m_3, m_4$  az  $M$ -ből az  $AD, AB, BC, CD$  oldalakra húzott magasságok hossza. Így  $T_1 = \frac{AD \cdot m_1}{2}$ ,  $T_2 = \frac{AB \cdot m_2}{2}$ ,  $T_3 = \frac{BC \cdot m_3}{2}$ ,  $T_4 = \frac{DC \cdot m_4}{2} \Rightarrow T_1 + T_3 = T_2 + T_4$ .

(7)  $T_1 = \frac{2}{3}T(ABD) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}T(ABCD)$ , hasonlóan  $T_3 = \frac{1}{3}T(ABCD)$ .

(8) Legyen  $m_1$ , illetve  $m_2$  az  $M$  pont távolsága az  $AB$ , illetve  $CD$  oldalaktól.

Akkor  $T_1 = \frac{AB \cdot m_1}{2}$ ,  $T_2 = \frac{CD \cdot m_2}{2} \Rightarrow T_1 + T_2 = \frac{1}{2}T(ABCD)$ .

(9) Legyen  $E \in (AD)$  úgy, hogy  $AE = ED$  és  $m_1$ , illetve  $m_2$  a  $D$ , illetve  $A$  pontok távolsága az  $EF$ -től.

Ekkor  $T(DEF) = \frac{EF \cdot m_1}{2} = \frac{(AB + CD) \cdot m_1}{4}$ ,  $T(AEF) = \frac{(AB + CD) \cdot m_2}{4}$ .

(10)  $T(AMND) = T(MBCN)$ ,  $T(AMQ) = T(MBQ)$ ,  $T(CQN) = T(DQN)$ .

$$(11) \quad T_1 = \frac{1}{4}T(DAC), T_3 = \frac{1}{4}T(BAC) \Rightarrow T_1 + T_3 = \frac{1}{4}T(ABCD), \text{ hasonlóan } T_2 + T_4 = \frac{1}{4}T(ABCD).$$

$$(12) \quad T(DQP) + T(BMN) = \frac{1}{4}T(ABCD) \text{ (a (11) alapján), } T(POQ) = T(MON) = \frac{1}{4}T(MNPQ) = \frac{1}{8}T(ABCD) \text{ ((11) és (3) alapján)} \Rightarrow T_1 + T_3 = \frac{1}{2}T(ABCD).$$

$$(13) \quad T(ABCD) = T(ADM) + T(AMB) + T(BMC).$$

Igazolható, hogy  $T(ADN) + T(BNC) = T(AMB)$ .

$$(14) \quad T_2 = T(M_1N_1M_2) + T(N_1N_2M_2) = \frac{1}{2}T(N_1AM_2) + \frac{1}{2}T(M_2N_1C) = \frac{1}{2}T(AN_1C) + \frac{1}{2}T(CAM_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}T(ADC) + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}T(CAB) = \frac{1}{3}T(ABCD) = \frac{1}{3}(T_1 + T_2 + T_3).$$

$$(15) \quad \text{Legyen } DD' \perp AC; BB' \perp AC. \text{ Ekkor } T_1 = \frac{1}{2}AO \cdot DD', T_2 = \frac{1}{2}AO \cdot BB', T_3 = \frac{1}{2}CO \cdot BB', T_4 = \frac{1}{2}CO \cdot DD'.$$

$$(16) \quad \sqrt{T(ABCD)} = \sqrt{T_1} + \sqrt{T_2} \iff T_1 + T_2 + T_3 + T_4 = T_1 + 2\sqrt{T_1T_2} + T_2 \iff T_3 + T_4 = 2\sqrt{T_1T_2} \stackrel{(15)}{\iff} T_3 + T_4 = 2\sqrt{T_3T_4} \iff T_3 = T_4.$$

$$(17) \quad \text{Legyenek rendre } x, y, z \text{ az } O \text{ pont távolságai a } BC = a, CA = b, AB = c \text{ oldalaktól, } h_a, h_b, h_c \text{ az } ABC \text{ háromszög megfelelő magasságai és } T = T(ABC). \text{ Ekkor } \frac{T_1}{T} = \left(\frac{x}{h_a}\right)^2 = \left(\frac{ax}{2T}\right)^2 \text{ és az analógjai, ugyanakkor } ax + by + cz = 2T.$$

$$(18) \quad \sqrt{\frac{T'}{T_1}} = \frac{A'C'}{DE} = \frac{C'E + ED + DA'}{ED} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} + \sqrt{\frac{T_1}{T_1}} + \sqrt{\frac{T_6}{T_1}}.$$

Tehát  $\sqrt{T'} = \sqrt{T_1} + \sqrt{T_2} + \sqrt{T_6}$ , hasonlóan igazolható, hogy  $\sqrt{T} = \sqrt{T_3} + \sqrt{T_4} + \sqrt{T_5}$ .

$$(19) \quad \text{Legyen } BB' \perp AC, \text{ így } T(ABC) = \frac{1}{2}BB' \cdot AC \text{ és } \sin A = \frac{BB'}{AB}.$$

$$(20) \quad \text{A (19) alapján } T = \frac{1}{2}AM \cdot AN \sin A = pq \frac{AB \cdot AC \sin A}{2} = pqT(ABC).$$

$$(21) \quad \text{A (20) alapján } T_1 = \frac{1}{5}T(ABC), T_2 = \frac{1}{6}T(ABC), T_3 = \frac{1}{5}T(ABC) \text{ és}$$

$$T = T(ABC) - T_1 - T_2 - T_3 \Rightarrow T = \frac{13}{30}T(ABC).$$

$$(22) \quad \text{A (20) alapján } T(ARQ) = \frac{2}{15}T(ABC), T(BMR) = \frac{1}{12}T(ABC), T(CNP) = \frac{1}{10}T(ABC), \text{ így } T = \left(1 - \frac{2}{15} - \frac{1}{12} - \frac{1}{10}\right)T(ABC) = \frac{41}{60}T(ABC).$$

$$(23) \quad \text{A (20) alapján } T(ARQ) = \frac{2}{15}T(ABC), T(BMS) = \frac{1}{6}T(ABC),$$

$$T(CNP) = \frac{1}{10}T(ABC), \text{ így } T = \left(1 - \frac{2}{15} - \frac{1}{6} - \frac{1}{10}\right)T(ABC) = \frac{3}{5}T(ABC).$$

$$(24) \quad AC = CC' \Rightarrow T(C'CB) = T, CB = BB' \Rightarrow T(C'CB) = T(C'BB'), \text{ tehát}$$

$$T(CB'C') = 2T.$$

(25) A (20) alapján  $T(AB_1C_1) = \frac{r}{1+r} \cdot \frac{1}{1+q}T$ ,  $T(BA_1C_1) = \frac{p}{1+p} \cdot \frac{1}{1+r}T$ ,  
 $T(CA_1B_1) = \frac{q}{1+q} \cdot \frac{1}{1+p}T$ , ahol  $T = T(ABC)$ , és  $T_1 = T - T(AB_1C_1) - T(BA_1C_1) - T(CA_1B_1)$ .

(26) Követhető a (24) ötlete, vagy a (20) szerint  $T(AA'C') = \frac{r}{1-r} \cdot \frac{1}{1-q}T$ ,

$$T(BB'A') = \frac{p}{1-p} \cdot \frac{1}{1-r}T, T(CC'B') = \frac{q}{1-q} \cdot \frac{1}{1-p}T.$$

(27) Az  $O$  ponton át meghúzzuk a  $BC$ -vel párhuzamos  $EF$  egyenest,  $E \in (BM)$ ,  $F \in (CN)$ ,  $\{D\} = AO \cap MN$ . Igazolható, hogy  $EO = OF$ , és így  $MD = DN \Rightarrow T_1 = T_2$ .

(28) Legyen  $AD$  oldalfelező és  $M$  az  $AD$  bal oldalán. Mivel  $T_1 = T_2$  és  $T(MBD) = T(MCD)$ , ezért  $T(ABDM) = T(ACDM) \iff T(ABD) - T(AMD) = T(ACD) + T(AMD)$ . Azonban  $T(ABD) = T(ACD) \Rightarrow T(AMD) = 0 \Rightarrow A, M, D$  kollineárisak.

(29) A (28) szerint  $M$  rajta van mind a három oldalfelezőn.

(30) A (28) szerint  $M$  rajta van a  $B$  pont és az  $[AC]$  felezőpontját összekötő szakaszon, ugyanakkor rajta van a  $C$  pont és a  $[BD]$  felezőpontját összekötő szakaszon, és így tovább. Ekkor  $AC$  és  $BD$  felezik egymást.